

Výukový materiál vytvořen v rámci projektu EU peníze školám

**REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU
CZ.1.07/1.4.00/21.3654**

**Základní škola Liberec,
Dobiášova 851/5, příspěvková organizace**



**evropský
sociální
fond v ČR**



EVROPSKÁ UNIE



**MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY**



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Téma:	DROGY - 1. ČÁST
Autor:	Mgr. Eva Ježková
Číslo materiálu:	VY_32_INOVACE_Vz7_32_13
Sada č.	32

Předmět: Výchova ke zdraví
Tematický okruh : Zneužívání návykových látek
Datum vytvoření: 15. 6. 2013
Cílová skupina: žák 2. stupně ZŠ - základní vzdělávání
Doporučeno pro: 7. a 8. ročník

Anotace:

- učivo je určeno pro výklad v 7.ročníku a pro opakování v 8.ročníku
- rozdelení drog do základních skupin, konopí, stimulanty a halucinogeny
- aplikace, příznaky, předávkování a dlouhodobé zneužívání
- posílení mezipředmětových vztahů, využití multimedialní techniky

D R O G Y

1.část

1. skupina - KONOPÍ

MARIHUANA



APLIKACE: kouření (balené cigarety, dýmky)
zapečené v jídle, čaje

PŘÍZNAKY: uvolnění, upovídavost, odbourání zábran,
nepřiměřený smích, náladovost,
zpomalené vnímání času, snížená koncentrace,
rozšířené zornice

PŘEDÁVKOVÁNÍ: vidiny, halucinace, mdloby,
možnost *psychotické epizody*



DLOUHODOBÉ UŽÍVÁNÍ: poškození srdce a plic, rakovina plic,
poruchy paměti, záněty spojivek,
muži: snížená potence
ženy: nepravidelná menstruace

1. skupina - KONOPÍ

● HAŠIŠ ● HAŠIŠOVÝ OLEJ



APLIKACE: ● kouření (speciální dýmky), jedení
● kouření v cigaretové směsi s tabákem

PŘÍZNAKY: ● podobné jako marihuana, k tomu zvýšená chuť k jídlu, nekoordinovanost, zhoršení orientace, při vyšších dávkách stav polospánku, pronikavé vnímání chuti, barev a zvuků

PŘEDÁVKOVÁNÍ: ● vidiny, halucinace, mdloby,
paranoia, možnost psychotické epizody



DLOUHODOBÉ UŽÍVÁNÍ: ● poškození srdce a plic, rakovina plic, poruchy paměti, záněty spojivek,
muži: snížená potence
ženy: nepravidelná menstruace

2. skupina - STIMULANTY

PERVITIN, AMFETAMIN

APLIKACE: **P** injekce, kouření
A polykání, šňupání, injekce



PŘÍZNAKY: neklid, vzrušení, nadměrná aktivita, povídavost, *euforie*, nespavost, ztráta chuti, pocení, suché ruce, halucinace, agresivita, rozšířené zornice, ztráta koordinace, závratě, kolaps

PŘEDÁVKOVÁNÍ: bolest hlavy, křeče, horečka, srdeční arytmie, selhání srdce, bezvědomí, možná A small black cross symbol.

DLOUHODOBÉ UŽÍVÁNÍ: poškození plic, jater, ledvin, halucinace, žaludeční vředy, vyhublost, poruchy intelektu, vysoký krevní tlak

2. skupina - STIMULANTY



KOKAIN, CRACK



APLIKACE: K šňupání, injekce
 C kouření (improvizované dýmky), cigarety s tabákem

PŘÍZNAKY: euporie, neúnavnost, zvýšená aktivita, pocit sebevědomí a sebejistoty, nespavost, stálá rýma, zvýšení sexuální aktivity, halucinace, zvýšení teploty

PŘEDÁVKOVÁNÍ: zvýšený neklid, *halucinace*, výrazná bledost, křeče, otok plic, zástava dýchání, možnost srdeč. infarktu, možná



DLOUHODOBÉ

UŽÍVÁNÍ: viz pervitin a amfetamin + sexuální lhůstějnost, šňupání - poškození nosní přepážky

3. skupina - HALUCINOGENY - HALUCINOGENNÍ AMFETAMINY

LSD

APLIKACE: polykání, lízání, kapání do očí

PŘÍZNAKY: změněné vnímání času, prostoru, barev, zvuků; chuťové i čichové halucinace, rozšířené zornice, *BAD TRIP*, zmatenosť, úzkost, ztráta kontroly, paranoia, dezorientace, *psychóza*



DLOUHODOBÉ

UŽÍVÁNÍ: hluboké deprese, sebevraždy, zhoršení paměti; mozkové, srdeční poškození, halucinace, flash backs

3. skupina - HALUCINOGENY - HALUCINOGENNÍ AMFETAMINY

PCP



APLIKACE: kouření (kombinace s tabákem či marihuanou), šňupání, injekce

PŘÍZNAKY: změna v chování, agresivita, pocit neuvěřitelné síly, mimovolné pohyby očí

PŘEDÁVKOVÁNÍ: neklid, rozrušenost, křeče, násilné chování, halucinace, psychóza, úzkost, smutek



DLOUHODOBÉ UŽÍVÁNÍ:

zhoršení paměti, řečové poruchy; mozkové, srdeční a plicní poškození, hepatitis, halucinace, paranoia, těžké psychózy, *flash backs*



3. skupina - HALUCINOGENY - HALUCINOGENNÍ AMFETAMINY

EXTASY

APLIKACE: polykání, injekce



PŘÍZNAKY: jako amfetaminy - rozšířené zornice, sucho v krku a ústech, nervozita, halucinogenní efekt, usnadňuje vcítění se do druhého a lepší komunikaci

PŘEDÁVKOVÁNÍ: křeče, horečka, srdeční problémy, bezvědomí možná



DLOUHODOBÉ UŽÍVÁNÍ: trvalé poruchy mozku, vyčerpanost,

UŽÍVÁNÍ: jaterní poškození, srdeční problémy, paranoia



NEJZNAMĚJŠÍ
HALUCINOGENY
V NAŠÍ PŘÍRODĚ

Zdroje:

- Všechny objekty použité k vytvoření materiálu jsou součástí SW ActivStudio, SW ActivInspire, Resource pack nebo jsou vlastní originální tvorbou autora.
- Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Dílo smí být dále šířeno pod licencí CC BY-SA (www.creativecommons.cz).
- Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je autor.
- Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

verze programu: ActivInspire 1.6

Vzdělávací oblast:

Člověk a zdraví

klíčová slova:

konopí, stimulanty, halucinogeny, pojmy z oblasti drogové problematiky

1. část Drog

Výklad :

1. skupina - marihuana

**hlediska : aplikace/ způsob užití / příznaky
předávkování**

dlouhodobé užívání

**pod sovičkou je vysvětlení pojmů: poruchy vnímaní a
poruchy myšlení**

**obsah 1. skupiny: hašiš a hašišový olej/ posuzování
stejných hledisek /**

pod sovičkou je vysvětlení pojmu paranoia

2. skupina - stimulanty

zástupci : pervitin, amfetamin

/stejná hlediska jako u 1. skupiny /

pod sovičkou je pojem euforie

pokračování 2. skupiny
zástupci : kokain, crack
pod sovičkou je pojem halucinace

3. skupina - halucinogeny a halucinogenní amfetaminy
zásupce : LSD
stejná hlediska
pod sovičkou je pojem psychóza, bad trip

pokračování 3. skupiny
zástupce: PCP
stejná hlediska
pod sovičkou pojem flash backs

pokračování 3. skupiny
zástupce : extasy
stejná hlediska
u otazníků jsou nejznámější halucinogeny v naší přírodě
/ houba - lysohlávka , látka psilocybin /